

8. ETKİNLİK

KULLANMA TALİMATI**Bu İlaç Ne İçin Kullanılır?**

Grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda ortaya çıkan; ateş, burun tıkanıklığı, halsizlik, genizde kaşıntı gibi semptomların tedavisinde kullanılır.

Bu İlaç Nasıl Kullanılır?

İlaç ağız yoluyla kullanılır. 5-10 yaş grubu çocuklar için günlük kullanım miktarı 8 ml'dir. Yemeklerden 15 dakika sonra kullanılmalıdır.

Olası Yan Etkileri Nelerdir?

İçeriğinde bulunan maddelere duyarlılığı olan kişiler ilacı dikkatli kullanmalıdır. Yandaki durumlardan biri olursa kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bilalriniz:

- Ciltte kızarıklık, kaşıntı,

- Baş ağrısı,

- Gözde kaşıntı ve sulanma.

Bunlar, ilacın sebep olabileceği yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri veya birkaçı varsa bu ilaca karşı alerjiniz var demektir.

Bu İlaç Nasıl Saklanır?

Bu ilacı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında, oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Not: Doktorunuzun tavsiyesi olmadan kullanmayınız.

Soruları, verilen ilaç kullanma talimatına göre cevaplayınız.

1. İlaç, hangi durumlarda kullanılmalıdır?

İlaç; grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda ortaya çıkan ateş, burun tıkanıklığı, halsizlik, genizde kaşıntı gibi semptomların tedavisinde kullanılmalıdır.

2. İlaç, 5-10 yaş grubu çocuklarda nasıl kullanılmalıdır?

İlaç, 5-10 yaş grubu çocuklarda günlük 8 ml ve yemeklerden 15 dakika sonra kullanılmalıdır.

3. İlacın yan etkileri nelerdir?

İlacın yan etkileri ciltte kızarıklık, kaşıntı, baş ağrısı, gözde kaşıntı ve sulanmadır.

4. İlacın saklama koşulları nelerdir?

Bu ilaç; çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajıyla saklanmalıdır. 25 derecenin altında, oda sıcaklığında saklanmalıdır.

9. ETKİNLİK



Dijital ve yazılı kaynaklarda bulunan "İçindekiler" bölümünden nasıl faydalanırız? Kısaca anlatınız.

Dijital ve yazılı kaynaklarda bulunan "İçindekiler" bölümü sayesinde kaynağın içeriği hakkında bilgi sahibi oluruz. Aradığımız bölümü çok daha hızlı bulabiliriz.